

FRUCTÓN

100% UP ENGORDE
Y CUAJADO MÁXIMO
PARA TUS FRUTOS



MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES
MINERALES BORO + POTASIO + MOLIBDENO



Agroindustrial Kimatec S.L.
C/ Santa Marta, nº 13. 04740. Roquetas de Mar.
(Almería). ESPAÑA.
Tel.: +34 950 34 69 09
www.kimatecgroup.com



Importador /
Distribuidor En Argentina
ING. CARLUCCIO Y ASOC. S.R.L.
www.ingcarluccio.com.ar

FRUCTÓN



CARACTERÍSTICAS

Fructón, es un producto sólido hidrosoluble que por sus características y composición induce el cuajado en distintos cultivos y a su vez favorece el engorde del fruto.

Se puede aplicar vía foliar o riego.

COMPOSICIÓN

	% p/p
Nitrógeno (N)	1.50
Potasio (K ₂ O) soluble en agua	5.00
Boro (B) soluble en agua	13.50

* Fructón incluye además en su formulación Molibdeno (Mo) < 5.00 p/p, 100 % soluble en agua.

DOSIS Y APLICACIONES

FORMA DE APLICACIÓN Y DOSIS		RECOMENDACIÓN
	FOLIAR 40 - 60 g/100 L	Realizar la aplicación pulverizando homogéneamente el cultivo, evitando las horas centrales en épocas de intenso calor
R I E G O	GOTEO 2 Kg/ha	Aplicar con un volumen suficiente de agua que asegure una aplicación homogénea
	GRAVEDAD 1 - 1,5 Kg/ha	Aplicar el producto una vez recorrido el agua de riego un tercio de la zona a regar

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

- Aplicar diluido en el agua de riego o pulverizado, evitando en lo posible mojar en exceso las plantas.
- Respetar los tiempos indicados.
- No mezclar con reguladores del crecimiento, cobres ni Fosetil Al.
- NO SOBREPASAR LA DOSIS INDICADA. • NO TRATAR CON TEMPERATURAS EXTREMAS. • NO UTILIZAR SOBRE CULTIVO DE PEPINO HOLÁNDES.

CULTIVOS

- Pomáceas, Carozos, Cítricos: Aplicar 10 - 15 días antes del inicio de la floración para mejorar el amarre de flores y repetir en desarrollo de fruto para aumentar el mismo.
- Frutilla: Para inducir el cuajado aplique al inicio de la floración, si la floración es escalonada podrá repetir el tratamiento 15 días después.
- Uva: Para estimular la salida del reposo, aplicar al comienzo de brotación. Repetir aplicación antes y después de la formación de los racimos.
- Hortícolas: Aplicar al comienzo de la floración y repetir a intervalos de 15 días para estimular y favorecer la floración, el engorde de los frutos y el cultivo en general.

100%
UP

ENGORDE
Y CUAJADO MÁXIMO
PARA TUS FRUTOS

